

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel :

170 F.

ÉDITION - GRANDES CULTURES

ISSN 0295 - 5776

- 1 -

BULLETIN n° 29 du 5 NOVEMBRE 1987

- COLZA** : CHARANÇON du BOURGEON TERMINAL : vol faible.
AUTRES INSECTES : situation.
MALADIES : quelques taches de phoma et de botrytis.
- ORGE** (MALADIES : situation.
(OSCINIES : quelques attaques bien visibles.
- ESOURGEON** (
- CÉRÉALES** : PUCERONS : toujours pas de vol.
ATTENTION AUX LIMACES.

COLZA

Stade 6 à 10 feuilles.

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

Situation :

Après les premières captures enregistrées dans la semaine du 19 au 23 octobre, le vol a été très faible, voire nul. De nouvelles captures sont signalées depuis le 29 dans quelques secteurs, mais le nombre de captures cumulées par piège reste peu élevé.

LIEU	NOMBRE de CHARANÇONS du BOURGEON TERMINAL (entre le 28/10 et le 4/11).
08. Villers devant le Thour	0
Machault	0
Chuffilly	0
10. Ville/Terre	3
Cunfin	5
Villiers	0
sous Praslin	0
51. Crugny	0
Pévy	0
Cauroy les Hermonville	0
52. Champigneulles	11
Percey le Petit	1

P. 230

Préconisation :

Dans les secteurs où des charançons ont été piégés, intervenir une dizaine de jours après les lères captures.

AUTRES INSECTES

MOUCHE DU CHOU

Les premiers dégâts sont bien visibles.

MINEUSES

Certaines feuilles sont minées par des larves de petites mouches qui n'affectent pas ou peu le développement du colza.

Préconisation :

Il est inutile d'intervenir.

MALADIES

Situation :

Présence de quelques taches de phoma et de botrytis très localement.

Préconisation :

Ne pas intervenir.

ORGE - ESCOURGEON

MALADIES

Situation :

On observe des taches d'helminthosporiose et les premiers foyers d'oïdium dans quelques parcelles.

Préconisation :

Ne pas intervenir.

OSCINIES

Situation :

Les larves d'oscinies provoquent un jaunissement de la dernière feuille, pouvant aller jusqu'à la disparition de la plantule

de céréale. Ces dégâts se limitent à quelques ronds dans une parcelle où on peut noter jusqu'à 50 % de disparitions de pieds. Les orges sont souvent plus atteintes que les blés.

Préconisation :

Compte tenu

- de la faible gravité des attaques,
 - du bon état végétatif des cultures,
 - d'aucune référence quant à l'efficacité de traitements sur des attaques déclarées
- TOUTE INTERVENTION EST DECONSEILLÉE.

CÉRÉALES

PUCERONS

Situation :

Les orges les plus avancées arrivent au début tallage. On note toujours très peu de pucerons sur les cultures (0 à 2 %).

Le stade du blé est très variable : de la levée jusqu'à 3 feuilles.

Pas ou peu de pucerons.

Préconisation :

Les risques restent faibles. Ne pas traiter dans l'immédiat. Continuer à surveiller les parcelles, surtout celles à proximité de champs de maïs ou de repousses d'orge.

LIMACES

Situation :

Des dégâts sont toujours signalés surtout dans les secteurs sensibles (sols motteux et humides). Les céréales sont sensibles de la germination au début du tallage.

Préconisation :

Si vous observez des dégâts ou la présence de limaces mortes près des pièges, intervenir de préférence le soir.

Prendre toutes les précautions utiles vis-à-vis du gibier. (cf. avis du 18 septembre).